



## FIBROSCOPIA LARINGEA o FIBROLARINGOSCOPIA

Gentile Paziente, la fibroscopia laringea è un esame diagnostico-strumentale che permette di:

- valutare l'anatomia, la funzione, l'eventuale patologia della laringe
- eseguire una valutazione della fonazione
- eseguire una valutazione della deglutizione
- stabilire un piano di riabilitazione foniatico-logopedico

La non esecuzione del test implica un'incompletezza dell'iter clinico e diagnostico con carente formulazione di una corretta diagnosi e una impossibilità di stabilire un corretto progetto riabilitativo con ciò che ne deriva in termini di prognosi.

Affinché il medico possa eseguire tale approfondimento diagnostico, è necessario ottenere in forma scritta il Suo consenso informato.

In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, il medico foniatra ha provveduto a spiegarLe in forma orale i concetti relativi alla procedura propostaLe.

Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti alla fibrolaringoscopia, in modo da informarLa esaurientemente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

### Descrizione dell'intervento

La fibrolaringoscopia consiste nell'introduzione di una fibra ottica flessibile di 3,4 mm di diametro per via nasale scegliendo la fossa nasale più ampia, viene così raggiunta la parte posteriore del retro bocca per visualizzare la laringe e la trachea.

Per la valutazione della fonazione può essere utilizzato un anestetico locale.

Per la valutazione della deglutizione non viene utilizzato l'anestetico locale poiché, riducendo la sensibilità a livello faringeo, potrebbe alterare il meccanismo deglutitorio; per questo motivo si può avvertire un fastidio durante l'inserimento del fibrolaringoscopio, ma non dolore.

La valutazione della deglutizione consiste in: 1) visione "a vuoto" del quadro laringeo; 2) valutazione della sensibilità di varie parti della laringe toccando direttamente le zone anatomiche con l'apice dello strumento (questo può provocare senso di nausea e tosse); 3) deglutizione di liquidi, cibi cremosi, cibi solidi, al fine di osservare in diretta le varie fasi della deglutizione e le eventuali alterazioni di queste.

A seconda del giudizio del medico e in presenza di altre patologie, l'esame fibroscopico può essere preceduto da una copertura antibiotica.



### Materiali impiegati

Fibrolaringoscopio flessibile del diametro di 3.4 mm.

In assenza della possibilità di sterilizzare lo strumento tra un paziente e l'altro, sarà necessario in occasione di ogni valutazione inserire la porzione flessibile del fibroscopio in una opportuna guaina monouso sterile.

### Benefici dell'intervento

Questa metodica oltre a consentire una visita molto più precisa, consente nella maggior parte dei pazienti di superare la difficoltà rappresentata dal riflesso del vomito.

### Rischi dell'intervento

Sono relativi a:

- possibilità di traumi sulle mucose a causa dello sfregamento della fibra con conseguenti sanguinamenti, epistassi, sensazione di leggero fastidio o prurito
- sensazione di intorpidimento della gola per alcuni minuti per effetto dell'anestetico locale
- reazioni ipotensive e allergie all'anestetico locale
- rari episodi di sindrome vagale, laringospasmo e/o dispnea

Data	Firma del paziente	Firma del medico	Firma della ASO