



## INTERVENTO DI RIABILITAZIONE PROTESICA MEDIANTE APPLICAZIONE DI PROTESI MOBILE PARZIALE O TOTALE

Gentile Paziente, per poter eseguire le terapie preventivate, è necessario ottenere in forma scritta il Suo consenso informato.

In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, l'odontoiatra ha provveduto a spiegarLe in forma orale i concetti relativi al trattamento propostoLe.

Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti gli interventi di terapia conservativa ed endodontica, in modo da informarla esaustivamente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

### Descrizione dell'intervento

Sostituzione degli elementi dentari mancanti utilizzando apparecchiature rimovibili (protesi parziali o totali) per restituire funzionalità, estetica e/o capacità di resistere al carico masticatorio nel caso di denti compromessi da pregresse patologie.

Estrazione dentaria degli elementi affetti da patologia non più aggredibile mediante terapia conservativa.

Esecuzione di impronte di precisione da cui dipenderà la costruzione degli elementi protesici.

Applicazione di protesi parziale (protesi rimovibile con appoggio dentale e mucoso) o totale (protesi rimovibile a totale appoggio mucoso).

### Benefici dell'intervento

Attraverso l'apposizione di una protesi mobile parziale o totale, si cerca di ristabilire funzione masticatoria e l'estetica al paziente.

### Rischi dell'intervento

Sono relativi a:

- possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici
- eventualità di ingestione accidentale di detti strumenti
- durata della terapia, a volte disagiata a causa della permanenza di protesi provvisorie
- risultati estetici e funzionali ottimali e duraturi sono talvolta difficili da ottenere, in particolare laddove il paziente non segua scrupolosamente una corretta igiene orale e i consigli forniti dall'odontoiatra
- l'appoggio mucoso può portare nel tempo ad un aumento del riassorbimento dell'osso alveolare.



## Complicazioni

- una volta applicata la protesi, è necessaria una corretta igiene orale, per salvaguardare il trofismo della mucosa gengivale
- durante alcune fasi, è possibile avere dolore, infezione, infiammazione e modeste emorragie facilmente controllabili
- alcuni elementi dentari potrebbero dover essere sottoposti a terapia canalare a seguito di una ipersensibilità secondaria alla riduzione dello spessore dello smalto oppure a causa di una superficialità anatomica del nervo dell'elemento trattato
- rare complicanze gnatologiche (click articolari, indolenzimenti muscolari, cefalee, cervicalgie) sono talvolta susseguenti a trattamento protesico
- è possibile che la protesi possa causare lesioni da decubito sulla mucosa, con fastidio, dolore, bruciore che devono essere subito segnalati per possibili infezioni o degenerazioni neoplastiche della mucosa orale.

Data	Firma del paziente	Firma del medico	Firma della ASO