



INTERVENTO DI TERAPIA CONSERVATIVA ED ENDODONTICA

Gentile Paziente, per poter eseguire le terapie preventivate, è necessario ottenere in forma scritta il Suo consenso informato.

In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, l'odontoiatra ha provveduto a spiegarLe in forma orale i concetti relativi al trattamento propostoLe.

Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti gli interventi di terapia conservativa ed endodontica, in modo da informarLa esaustivamente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

Descrizione dell'intervento

Rimozione con apposito strumentario della carie ed eventualmente del tessuto pulpare (devitalizzazione), con successiva ricostruzione del dente.

Materiali impiegati

Otturazione provvisoria: cemento all'ossido di zinco ed eugenolo, o prodotti simili

Otturazione definitiva: composito resinoso

Otturazione del canale radicolare: guttaperca

Perni endocanalari costituiti da: fibra di carbonio oppure fibra di silice, perni metallici

Benefici dell'intervento

Conservazione dente ed eliminazione di infezione, infiammazione e dolore derivanti dalla patologia dentale.

Rischi dell'intervento

Sono relativi a:

- impiego inevitabile di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui alcuni soggetti possono risultare particolarmente sensibili per allergie, patologie renali, cardiache, endocrine o stato di gravidanza
- possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici
- eventualità di ingestione accidentale di detti strumenti.



Complicazioni

- una volta effettuata l'otturazione, è possibile la permanenza per tempi più o meno lunghi di sensibilità termica o ad alcune sostanze, la mancata risoluzione di tale sintomatologia rende necessaria la devitalizzazione dell'elemento
- una ricostruzione in materiale composito può nel tempo cambiare tonalità di colore
- in caso di terapia canalare è possibile avvertire temporaneamente alcuni sintomi spiacevoli quali, ad esempio, dolore o sensazione di allungamento del dente
- i denti devitalizzati possono risultare più fragili del normale
- in alcuni casi è possibile che sia necessario provvedere alla protesizzazione, alla resezione del suo apice (apicectomia) o all'estrazione dell'elemento dentario.

Possibili alternative

Estrazione del dente.

Data	Firma del paziente	Firma del medico	Firma della ASO